




HPV (Humant Papillomvirus)
drabbar även unga män

HPV (Humant Papillomvirus)

HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige och i världen. Det drabbar upp till 90 % av alla sexuellt aktiva män och kvinnor någon gång i livet.


Kondom skyddar inte fullt ut eftersom HPV smittar både mellan slemhinnor, vid hudkontakt och vid hud mot slemhinna.

Det finns många olika typer av HPV. De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva medan andra blir kvar i kroppen och kan leda till könsvårter (kondylom) eller cancer.

Minst 4 300 svenskar söker varje år vård för kondylom och ca 550 män diagnostiseras med HPV-relaterad cancer varje år.

Män och HPV genom livet

Virusnivåerna hos män ligger fortsatt högt under hela livet. Man kan smitta andra utan att själv ha symtom.



HPV kan finnas i kroppen i många år utan att man märker av det. Det går därför inte att veta när man har blivit smittad eller om man har smittat andra.

Hos kvinnor är förekomsten som högst mellan 18-29 år, för att sedan minska medan förekomsten hos män fortsatt ligger högt under hela livet.

Förekomsten av HPV-relaterade sjukdomar hos män anses vara underskattad. I dagsläget finns det ingen etablerad screening eller test för att få reda på vilka HPV-virus män har, såsom det gör för kvinnor vid förstadium till livmoderhalscancer. Det går dock att förebygga HPV-infektioner genom vaccination.

Ovaccinerade män får oftare återkommande infektioner



Minst 4 300 svenskar drabbas av kondylom varje år

Kondylom hos män:

- ← ~44 % får minst ett återfall av kondylom
- ← ~22 % får minst två återfall av kondylom

Könsvärtor är mycket smittsamma och kan vara obehagliga och generande. Du kan se eller känna vårtorna som kan se ut på olika sätt. Det vanligaste är flikiga eller rundade och lätt upphöjda vårtor i hudfärg eller, rosa, röda eller bruna. De kan vara enstaka eller flera som sitter tätt.

Du kan också få ett eller flera av följande symtom:

- klåda eller sveda
- små blödningar från vårtorna
- besvär vid samlag

ca **90 %**

av alla kondylomfall kan förebyggas med vaccination.



Kondylom kan sitta på olika platser i underlivet

- På penis
- På förhuden
- Vid urinröret
- Runt anus
- I ljumskarna

Läs mer på
HPV vaccin



hpvvaccin.se

