

*Denna information delas ut av din vaccinator*

Till Dig som vaccineras med

# GARDASIL<sup>®</sup> 9



Vaccination mot HPV-relaterad cancer och sjukdom

**INFORMATION OM GARDASIL 9 TILL PATIENTER**

Läs noga igenom bipacksedeln. Den innehåller information som är viktig för dig eller ditt barn. Bipacksedeln finns tillgänglig via [FASS.se](https://fass.se)



## Vad är GARDASIL 9?

GARDASIL 9 är ett vaccin som är avsett för barn och ungdomar från 9 år samt vuxna. Vaccinet hjälper till att skydda mot sjukdomar som orsakas av vissa typer av humant papillomvirus (HPV) och kan drabba både tjejer och killar. GARDASIL 9 riktar sig mot nio specifika HPV-typer 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.

Vaccinet skyddar mot olika sjukdomar som kan uppstå till följd av dessa virus.

### DET INKLUDERAR:

- cellförändringar som är förstadier till cancer eller redan utvecklad cancer i de kvinnliga könsorganen, såsom livmoderhalsen, de yttre delarna av könsorganet och slidan
- cellförändringar som är förstadier till cancer eller redan utvecklad cancer i anus
- könsvårter (kondylom)



Det är viktigt att veta att GARDASIL 9 inte fungerar som en behandling om du redan har en HPV-infektion. Om du redan är infekterad med en av de HPV-typer som vaccinet skyddar mot, kommer GARDASIL 9 inte att hjälpa mot just den infektionen. Om du är infekterad med en typ av HPV, kan vaccinet dock fortfarande ge skydd mot de andra typerna som ingår i GARDASIL 9.

Det är också bra att veta att GARDASIL 9 inte kan orsaka HPV-relaterade sjukdomar. När du får vaccinet, hjälper det ditt immunsystem - kroppens eget försvar - att skapa antikroppar mot de nio HPV-typerna i vaccinet. Dessa antikroppar ger dig ett skydd mot sjukdomar som orsakas av dessa virus.

GARDASIL 9 skyddar inte mot alla typer av humant papillomvirus. Vaccination ersätter inte rutinmässig gynekologisk cellprovtagning. Kvinnor bör fortsätta att följa anvisningar om regelbundna cellprovs- kontroller samt förebyggande och skyddande åtgärder.

# Om skyddet

---

Det är inte säkert att GARDASIL 9 ger ett fullständigt skydd till alla som vaccineras. Baserat på epidemiologiska studier förväntas GARDASIL 9 skydda mot de HPV-typer som orsakar cirka:

- 90% av all livmoderhalscancer
- 90 % av alla kondylom (könsvärtor)
- 85-90 % av all HPV-relaterad vulvacancer
- 80-85 % av all HPV-relaterad cancer i vagina
- 90-95 % av all HPV-relaterad analcancer
- samt i olika grad mot cellförändringar och förstadier till dessa cancerformer.



## Vanliga biverkningar

---

Liksom andra vacciner kan HPV- vaccin orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar är (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter) reaktion vid injektionsstället (rodnad, svullnad, smärta) och huvudvärk. Dessa biverkningar var oftast milda till måttliga i intensitet.

Andra vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 10 patienter) är reaktion vid injektionsstället (blåmärke, klåda), feber, trötthet, yrsel och illamående.


Kontakta sjukvården om ni har frågor kring vaccinationen eller eventuella biverkningar.

Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket via deras hemsida; [lakemedelsverket.se](https://lakemedelsverket.se) Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om vaccinets säkerhet.

## Hur ges GARDASIL 9?


GARDASIL 9 ges som en injektion genom huden in i muskeln (oftast överarm) av en läkare eller sjuksköterska. Doseringsintervall enligt nedan.

### Vaccination med 2 doser för barn och ungdomar i åldern 9-14 år



Om dos 2 administreras tidigare än 5 månader efter den första dosen, ska en tredje dos alltid ges.

### Vaccination med 3 doser för ungdomar och vuxna i åldern 15 år och äldre



Dos 2 ska administreras tidigast 1 månad efter den första dosen och dos 3 ska ges minst 3 månader efter den andra dosen. **Alla tre doser ska ges inom en 1-årsperiod.**

### OM DU HAR GLÖMT EN DOS AV GARDASIL 9

Om du missar en planerad injektion bestämmer läkaren när du ska få den missade dosen. Det är viktigt att du följer läkarens eller sjuksköterskans anvisningar om återbesök för uppföljningsdoserna.

För mer information om användning, varningar och begränsningar läs bipacksedeln på [fass.se](http://fass.se). Kontakta din vaccinatör eller annan sjukvårdspersonal om du har frågor.

Läs mer om  
hpv här:



msd.se, 08-5781 35 00  
Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway,  
NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.  
SE-NON-00215 03/2025