



HPV (Humant Papillomvirus) för dig som är kvinna

HPV (Humant Papillomvirus)

HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige och i världen. Det drabbar mer än 80 % av alla sexuellt aktiva kvinnor och män någon gång i livet.

Kondom skyddar inte fullt ut eftersom HPV smittar både mellan slemhinnor och vid hud mot slemhinna.

Det finns många olika typer av HPV. De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva medan andra blir kvar i kroppen och kan leda till könsvärtor (kondylom) eller cellförändringar. Cellförändringar kan i sin tur leda till cancer, exempelvis livmoderhalscancer, vagina och vulvacancer.


Livmoderhalscancer är den 2:a vanligaste cancerformen bland kvinnor i fertil ålder



HPV kan finnas i kroppen i många år utan att man märker av det. Det går därför inte att veta när man har blivit smittad.

I dagsläget finns ett väletablerat screeningprogram i Sverige för att upptäcka cellförändringar (låggradiga och höggradiga) som kan leda till livmoderhalscancer. Tänk på att det är viktigt att du som kvinna 23-70 år går regelbundet på dessa gynekologiska cellprovskontroller. Det går även att förebygga HPV-infektioner genom vaccination.

Livmoderhalscancer - en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor



Totalt antal (miljoner) nya cancerfall diagnostiserade hos kvinnor globalt år 2022.

Alla cellförändringar leder inte till cancer



14 %–31 % av höggradiga cellförändringar kan utvecklas till livmoderhalscancer om de lämnas obehandlade.

Vissa grupper löper ökad risk för sjukdomar som en följd av HPV-infektioner

Kvinnor som genomgår konisering, personer som lever med hiv, transpersoner

1. Kvinnor som behandlas p.g.a. höggradiga cellförändringar kan ha ökad risk för nya cellförändringar och livmoderhalscancer i upp till 25 år efter avslutad behandling.
2. Infektion med HPV är vanlig hos kvinnor och män som lever med hiv och kroppen har svårare att läka ut infektionen i dessa fall.
3. Transpersoner och personer som lever med hiv har högre förekomst av HPV jämfört med övriga befolkningen, enligt en studie från Karolinska Institutet (KI).¹



Förekomst i Sverige

- **1000 (ca)** kvinnor diagnostiseras med HPV-relaterad cancer varje år.
- **8 000 (ca)** kvinnor genomgår konisering varje år.
- Minst **4 300** svenskar (kvinnor/män) söker varje år vård för kondylom

Referenser:

1. Ejaz M, et al. BMJ Open. 2021 Nov 1;11(11):e052176.